

PHARMATEK



PHARMAIODO

Piazza delle Industrie 3 – 26010 Cremosano (Cr)

data: 20/10/10

Scheda Tecnica

Descrizione:	Disinfettante ad ampio spettro per la disinfezione e l'igiene della pelle nei reparti a rischio infettivo. Uso esterno Presidio Medico-Chirurgico n.19661
Composizione:	100 ml di soluzione contengono: polivinilpirrolidone iodio g 10 (equivalenti a g. 1 di iodio) coformulanti ed acqua depurata q.b. a ml 100.
Proprietà chimico-fisiche:	soluzione limpida di colore rosso scuro, schiumosa per agitazione. Odore caratteristico di iodio pH = 4,5±1,0 Solubile in acqua in tutti i rapporti Peso specifico: 1,02 – 1,03.
Meccanismo d'azione:	il PVP-I contiene il 10% di iodio libero disponibile il quale viene rilasciato gradualmente dal complesso a seguito di contatto con il substrato. L'antisepti viene esplicata dallo iodio libero con un'azione ossidante diretta e persistente.
Spettro d'azione:	lo spettro d'azione è molto ampio e comprende batteri Gram positivi e Gram negativi, batteri acidi ed acido-resistenti, e virus. La sua attività è mantenuta in presenza di materiali organici. Non si conoscono fenomeni di resistenza.
Campi di impiego:	Antisettico- antibatterico da utilizzarsi nei seguenti casi: Preparazione del campo operatorio Disinfezione della cute prima della terapia iniettiva Impiego come antisettico-microbiocida negli ambulatori medici.
Modalità d'uso:	Si impiega puro. Si applica direttamente sull'area interessata con un batuffolo di cotone o con un tampone di garza.
Avvertenze:	Solo per uso esterno. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Da non usare su cute lesa o mucose. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua. Non impiegare sulla parte trattata contemporaneamente saponi o soluzioni/pomate contenenti mercurio. In caso di incidenti o malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danno ai bambini non ancora nati.
Conservazione e validità:	Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Conservare il recipiente ben chiuso e lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non riutilizzare il contenitore. Il periodo di validità quantificato in 36 mesi si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.
Confezioni:	flaconi da 3-5-6-7-8-10-20-50-100-125-150-200-250-300-500-1000-1500-2000-5000 e tuniche da litri 10-20-25-30-60